

## Deeltentamen differentiaalvergelijkingen 18 april 2011

- Zet op elk vel dat je inlevert je naam, het nummer van je collegekaart en bij voorkeur ook de naam van je werkcollega-leider (Sebastiaan Janssens, Wilfred de Graaf of Jori Matthijssen).
- Laat bij elke opgave duidelijk zien hoe je aan je antwoorden komt.
- Ook als je (een onderdeel van) een opgave niet kunt maken mag je dat onderdeel/die opgave uiteraard wel gebruiken.
- Alle 9 opgaven tellen even zwaar.
- *SUCCES!*

Een (systeem van) autonome differentiaalvergelijking(en)  $\dot{y} = f(y)$  is van gradiënt-type als er  $V : \mathbb{R}^n \supset \rightarrow \mathbb{R}$  bestaat met  $f = \text{grad}V$ . Wij veronderstellen in het vervolg  $V \in C^2$ .

1. Los voor  $V(y) = y^3 - 3y + 9$  de gradiënt-vergelijking  $\dot{y} = V'(y)$  op. Wat zijn de dynamische verschillen tussen de twee oplossingen met beginwaarden in minimum en maximum? *Hint*: maak een plaatje.
2. Laat zien dat elke scalaire autonome differentiaalvergelijking met  $f \in C^1$  van gradiënt-type is. Laat tevens zien dat de matrix van een lineaire gradiënt-vergelijking symmetrisch is.
3. Bereken de tijdsafgeleide van  $V(y(t))$ , waar  $y(t)$  een oplossing van  $\dot{y} = \text{grad}V$  is. Toon hiermee aan dat een differentiaalvergelijking van gradiënt-type nooit een periodieke baan kan hebben. *Herinnering*: een periodieke baan heeft een minimale periode  $\tau > 0$  met  $y(t + \tau) = y(t)$  voor alle  $t \in \mathbb{R}$ .
4. Bepaal een fundamentele matrix voor de door  $V(y) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - 2y_1y_2 - 2y_2y_3 - 2y_1y_3$  gegeven gradiënt-vergelijking  $\dot{y} = \text{grad}V$ .

Beschouw de algemene lineaire gradiënt-vergelijking in het vlak, gegeven door  $V(y) = \frac{a}{2}y_1^2 + \frac{b}{2}y_2^2 + cy_1y_2$ . Noem de zo aan de rechter kant verkregen matrix  $A$ .

5. Geef spoor, determinant, eigenwaarden en de discriminant  $\Delta$  van de eigenwaardevergelijking voor  $A$  in termen van de parameters  $a$ ,  $b$  en  $c$ .
6. Voer de nieuwe parameters  $s = \frac{a+b}{\sqrt{2}}$ ,  $u = \frac{a-b}{\sqrt{2}}$  en  $v = \sqrt{2}c$  in en schets in de  $(s, u, v)$ -ruimte het oppervlak  $\det A = 0$ .
7. Geef voor de parameterwaarden  $(s, u, v) = (3, 1, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 0), (-1, 1, 0)$  en  $(-3, 1, 0)$  elk een faseplaatje. Dit levert samen met opgave 6 een bifurcatie-diagram op. Hoe veranderen de faseplaatjes langs de  $s$ -as (dus voor  $u = v = 0$ )?

Beschouw op  $\mathbb{R}^2$  de door  $V(y) = \frac{1}{2}y_1^2y_2 + \frac{1}{6}y_2^3 - 2y_2$  gegeven niet-lineaire gradiënt-vergelijking.

8. Geef de evenwichtspunten en bepaal hun stabiliteit.
9. Schets het faseplaatje.