

Numerieke wiskunde 1A (WISB251) 22 december 2003

- Vermeld op elk vel dat je inlevert je naam, en op het eerste vel bovendien je studentnummer, het aantal ingeleverde vellen en je studierichting.
- Het is *niet* toegestaan het diktaat of je aantekeningen te raadplegen.
- Resultaten uit een vorig onderdeel van een opgave mag je gebruiken, ook al lukt het je niet dat onderdeel te bewijzen.
- **SUCCES!**

Opgave 1

Laat f een voldoende gladde functie zijn. We benaderen $f'(x_0)$ door

$$Q(h) = \frac{-\frac{3}{2}f(x_0) + 2f(x_0 + h) - \frac{1}{2}f(x_0 + 2h)}{h}.$$

- a) Bewijs m.b.v. Taylor polynomen dat

$$f'(x_0) - Q(h) = c_1 h^2 f'''(x_0) + \mathcal{O}(h^3) \quad (h \rightarrow 0), \quad (1)$$

en geef de constante c_1 .

- b) We nemen nu aan dat de functiewaarden belast zijn met een *relatieve* fout ε , waarvoor steeds geldt dat $|\varepsilon| \leq \bar{\varepsilon}$. De ten gevolge van deze fouten verstoorde $Q(h)$ noemen we $\tilde{Q}(h)$. Bewijs voor een geschikte constante c_2 dat

$$|Q(h) - \tilde{Q}(h)| \leq \frac{c_2 \bar{\varepsilon}}{h} M_2, \quad (2)$$

waarbij $M_2 := \max_{x \in [x_0, x_0 + 2h]} |f(x)|$.

- c) Bepaal op basis van (2) en (1), waarbij we de hogere orde term voorlopig verwaarlozen, een optimale $h = h_{\text{opt}}$, en geef een bovengrens voor $|f'(x_0) - \tilde{Q}(h_{\text{opt}})|$.
- d) Zij p het Lagrange interpolatiepolynoom van f op de steunpunten x_0 , $x_0 + h$ en $x_0 + 2h$. Laat zien dat $Q(h) = p'(x_0)$.
- e) Geef een uitdrukking voor $f(x) - p(x)$, en bewijs hiermee dat er een $\xi(x) \in (x_0, x_0 + 2h)$ is zo dat

$$f'(x_0) - Q(h) = c_1 h^2 f'''(\xi(x))$$

(Hint: Gebruik de produktregel voor het differentiëren, en het feit dat x_0 een steunpunt is van het Lagrange polynoom).

Opgave 2

Voor het berekenen van $I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$ beschouwen we, voor voldoende gladde f , de kwadratuurformule

–le

$$Q(f) = 2f(0) + w(f'(\lambda) - f'(-\lambda)),$$

waarbij $\lambda \in (0, 1]$ en w een geschikt gewicht.

- Toon aan dat ongeacht de waarde van w en λ , ieder polynoom x^{2i+1} ($i \in \mathbb{N}$) exact geïntegreerd wordt.
- Bepaal λ en w zodanig dat alle polynomen van graad kleiner of gelijk 5 exact geïntegreerd worden. Beantwoord 3 t/m 5 voor deze λ en w .
- Bepaal C en k in de formule voor $R(f) := I(f) - Q(f)$ aannemende dat deze de volgende gedaante heeft:

$$R(f) = Cf^{(k)}(\xi) \quad (\xi \in (-1, 1)).$$

- Zij p het Hermite interpolatiepolynoom van f op de punten $-\lambda$, 0 en λ . Toon aan dat $Q(f) = I(p)$.
- Bewijs nu dat de veronderstelling in 3 juist is; d.w.z. $R(f)$ is inderdaad van de vorm $Cf^{(k)}(\xi)$.

We bekijken nu het geval $\lambda = 1$, en vervangen vervolgens het interval $[-1, 1]$ door een algemeen interval $[a, b]$. M.a.w., we beschouwen de kwadratuurformule

$$\tilde{Q}(f) = (b-a)f\left(\frac{b+a}{2}\right) + w(f'(b) - f'(a))$$

ter benadering van $\int_a^b f(x) dx$.

- Bepaal w zodanig dat polynomen van een zo hoog mogelijke graad nog exact geïntegreerd worden.

Bewezen kan worden (hoef je niet te doen) dat er een constante $c \neq 0$ is waarvoor

$$\int_a^b f(x) dx - \tilde{Q}(f) = c(b-a)^5 f^{(4)}(\xi) \quad (\xi \in (a, b)).$$

Verdeel nu $[-1, 1]$ in n gelijke delen met lengte h . Pas op ieder deelintervalletje de “ \tilde{Q} -regel” toe en noteer het resultaat als $T_n(f)$.

- Hoeveel evaluaties van f en f' vergt het opstellen van $T_n(f)$?
- Bewijs dat er een getal d is, welke slechts afhankelijk is van f , zodanig dat

$$\int_{-1}^1 f(x) dx - T_n(f) = dh^4 + o(h^4) \quad (h \downarrow 0).$$

- Geef een schatting voor de fout in $T_{2n}(f)$ in termen van $T_{2n}(f)$ en $T_n(f)$.