

Tentamen Bewijzen in de Wiskunde (WISB102)

Donderdag 7 november 2019, 13:30 - 16:30

Docenten: *Martin Bootsma & Carel Faber & Heinz Hanßmann & Jan-Willem van Ittersum & Johan van de Leur & Guido Terra-Bleeker*

- GEBRUIK EEN APART VEL VOOR IEDERE OPGAVE. Het tentamen bestaat uit zes opgaven die elk even zwaar meetellen.
 - Dit tentamen bevat een NEDERLANDSE en een ENGELSE VERSIE. De Engelse versie staat na de Nederlandse versie. **The English exam follows below.**
 - Schrijf je naam en studentnummer op elk vel.
 - Het gebruik van telefoons, computers, rekenmachines, boeken of aantekeningen is niet toegestaan.
 - Geef niet alleen antwoorden, maar laat bij elke (deel)opgave duidelijk zien hoe je aan je antwoorden komt en bewijs al je beweringen.
 - Ook als je een onderdeel van een opgave niet kunt bewijzen, mag je dat resultaat in het vervolg wel gebruiken.
-

Opgave 1 (nieuw vel papier)

- (a). (*2 punten*) Laat P en Q twee beweringen zijn. Laat zien dat de beweringen $\sim (P \wedge Q)$ en $(\sim P) \vee (\sim Q)$ logisch equivalent zijn. (Je mag hierbij (uiteeraard) geen gebruik maken van de rekenregels voor beweringen; dit is immers zelf één van de rekenregels.)

Voor het vervolg van de opgave beschouwen we de volgende twee beweringen:

$$A: \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists n \in \mathbb{Z}: \quad x \leq n \leq x + 1.$$

$$B: \quad \exists n \in \mathbb{Z}, \quad \forall x \in \mathbb{R}: \quad x \leq n \leq x + 1.$$

- (b). (*2 punten*) Herformuleer de ontkenning van bewering A zodanig dat er geen expliciete ontkenning meer in voorkomt.
- (c). (*2 punten*) Herformuleer de ontkenning van bewering B zodanig dat er geen expliciete ontkenning meer in voorkomt.
- (d). (*2 punten*) Bewijs of weerleg bewering A .
- (e). (*2 punten*) Bewijs of weerleg bewering B .

Opgave 2 (nieuw vel papier)

In deze opgave beschouwen we de volgende vier functies:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: \quad f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1},$$

$$g: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}: \quad g(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1},$$

$$h: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]: \quad h(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1},$$

$$k: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow [0, 1]: \quad k(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}.$$

Hierin is $\mathbb{R}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ de verzameling van alle niet-negatieve reële getallen.

- (a). (4 punten) Welke van deze vier functies zijn injectief?
- (b). (4 punten) Welke van deze vier functies zijn surjectief?
- (c). (2 punten) Welke van deze vier functies zijn bijectief?

Ter herinnering: laat duidelijk zien hoe je aan je antwoorden komt en bewijs al je beweringen.

Opgave 3 (nieuw vel papier)

De rij a_n wordt recursief gedefinieerd voor alle $n \in \mathbb{N}$ door $a_1 = 5$, $a_2 = 55$ en, voor alle $n \in \mathbb{N}$ met $n \geq 3$, door

$$a_n = 11a_{n-1} - 24a_{n-2}.$$

- (a). (5 punten) Bewijs voor alle $n \in \mathbb{N}$ dat

$$a_n = 8^n - 3^n.$$

- (b). (4 punten) Bewijs dat $a_n \equiv 5 \pmod{10}$ voor alle $n \in \mathbb{N}$.
- (c). (1 punt) Wat is het laatste cijfer van a_{2019} (in het tientallig stelsel) ?

Opgave 4 (nieuw vel papier)

Neem aan dat de functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en de functie $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differentieerbaar zijn in het punt $x = a$ met afgeleide $f'(a)$ en $g'(a)$, respectievelijk. Definieer de functie h als de som van de functies f en g . Oftewel, $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is gedefiniëerd door $h(x) = f(x) + g(x)$ voor alle $x \in \mathbb{R}$.

- (a). (1 punt) Geef de definitie van differentieerbaarheid van f in a in termen van een limiet.
- (b). (2 punten) Geef de definitie van differentieerbaarheid van f in a in termen van ε en δ .
- (c). (7 punten) Bewijs, gebruik makend van de ε - δ definities van differentieerbaarheid, dat de functie h differentieerbaar is in het punt $x = a$ en laat zien dat de afgeleide in het punt $x = a$ wordt gegeven door $h'(a) = f'(a) + g'(a)$. Je mag hierbij geen gebruik maken van de rekenregels voor limieten.

Opgave 5 (nieuw vel papier)

In deze opgave gebruiken we de notatie \mathbb{R}^2 voor het Cartesisch product $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Vervolgens definiëren we de relatie R op \mathbb{R}^2 door

$$(a, b) R (c, d) \iff a^2 - c^2 = d - b.$$

(a). (4 punten) Bewijs dat R een equivalentierelatie is.

Voor elke $h \in \mathbb{R}$ definiëren we de verzameling $A_h = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y = h\}$.

(b). (3 punten) Bewijs dat de collectie verzamelingen $\{A_h\}_{h \in \mathbb{R}}$ een partitie is van \mathbb{R}^2 .

(c). (3 punten) Bewijs voor alle $h \in \mathbb{R}$ dat

$$A_h = [(0, h)] .$$

Hierin is $[(0, h)]$ de equivalentieklasse van $(0, h)$ ten opzichte van de relatie R .

Opgave 6 (nieuw vel papier)

In deze opgave zijn A en B deelverzamelingen van een overaftelbare verzameling U .

(a). (4 punten) Bewijs dat $A \cup B$ aftelbaar is als A en B aftelbaar zijn en hun doorsnede $A \cap B$ leeg is.

(b). (3 punten) Bewijs:

$$A \text{ is aftelbaar} \implies U - A \text{ is overaftelbaar.}$$

(c). (3 punten) Bewijs of weerleg:

$$B \text{ is overaftelbaar} \implies U - B \text{ is aftelbaar.}$$

EINDE TENTAMEN - ENGELSE VERTALING HIERONDER

THE ENGLISH EXAM FOLLOWS BELOW

Z.O.Z. / P.T.O.

Exam “Bewijzen in de Wiskunde” (WISB102)

Thursday, November 7, 2019, 13:30 - 16:30

Instructors: *Martin Bootsma & Carel Faber & Heinz Hanßmann & Jan-Willem van Ittersum & Johan van de Leur & Guido Terra-Bleeker*

- USE A SEPARATE SHEET OF PAPER FOR EACH EXERCISE. The exam consists of six exercises, each worth 10 points.
 - Write your name and student number on each sheet of paper.
 - The use of phones, computers, calculators, books or notes is not allowed.
 - Do not only give answers, but for each (sub)exercise show clearly how you obtain your answers and prove all your claims.
 - Even if you don't succeed in proving part of an exercise, you may use the result in the remainder of the exercise.
-

Exercise 1 (new sheet of paper)

- (a). (*2 points*) Consider two statements P and Q . Show that the statements $\sim (P \wedge Q)$ and $(\sim P) \vee (\sim Q)$ are logically equivalent. (You are not allowed to make use of the basic laws for logical equivalence for this; it is one of those laws by itself, after all.)

In the remainder of this exercise we consider the following two statements:

$$A: \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists n \in \mathbb{Z}: \quad x \leq n \leq x + 1.$$

$$B: \quad \exists n \in \mathbb{Z}, \quad \forall x \in \mathbb{R}: \quad x \leq n \leq x + 1.$$

- (b). (*2 points*) Reformulate the negation of statement A such that it does not contain an explicit negation any more.
- (c). (*2 points*) Reformulate the negation of statement B such that it does not contain an explicit negation any more.
- (d). (*2 points*) Prove or disprove statement A .
- (e). (*2 points*) Prove or disprove statement B .

Exercise 2 (new sheet of paper)

In this exercise we consider the following four functions:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: \quad f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1},$$

$$g: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}: \quad g(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1},$$

$$h: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]: \quad h(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1},$$

$$k: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow [0, 1]: \quad k(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}.$$

Here we use $\mathbb{R}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ to denote the set of all non-negative real numbers.

- (a). (4 points) Which of these four functions are injective?
- (b). (4 points) Which of these four functions are surjective?
- (c). (2 points) Which of these four functions are bijective?

Reminder: show clearly how you obtain your answers and prove all your claims.

Exercise 3 (new sheet of paper)

The sequence a_n is defined recursively for all $n \in \mathbb{N}$ by $a_1 = 5$, $a_2 = 55$ and, for all $n \in \mathbb{N}$ for which $n \geq 3$, by

$$a_n = 11a_{n-1} - 24a_{n-2}.$$

- (a). (5 points) For all $n \in \mathbb{N}$, prove that

$$a_n = 8^n - 3^n.$$

- (b). (4 points) Prove that $a_n \equiv 5 \pmod{10}$ for all $n \in \mathbb{N}$.
- (c). (1 point) What is the final digit of a_{2019} (in the decimal number system) ?

Exercise 4 (new sheet of paper)

Assume that the two functions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ are differentiable in the point $x = a$ with derivatives $f'(a)$ and $g'(a)$, respectively. Define the function h as the sum of the functions f and g . In other words, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $h(x) = f(x) + g(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$.

- (a). (1 point) Give the definition of differentiability of f in $x = a$ in terms of a limit.
- (b). (2 points) Give the definition of differentiability of f in $x = a$ in terms of ε and δ .
- (c). (7 points) Prove, using the ε - δ definitions of differentiability, that the function h is differentiable in the point $x = a$ and show that the derivative in the point $x = a$ is given by $h'(a) = f'(a) + g'(a)$. You are not allowed to use the standard properties of limits in this exercise.

Exercise 5 (new sheet of paper)

In this exercise we use \mathbb{R}^2 to denote the Cartesian product $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. We define the relation R on \mathbb{R}^2 by

$$(a, b) R (c, d) \iff a^2 - c^2 = d - b.$$

(a). (4 points) Prove that R is an equivalence relation.

For every $h \in \mathbb{R}$ we define the set $A_h = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y = h\}$.

(b). (3 points) Prove that the collection $\{A_h\}_{h \in \mathbb{R}}$ is a partition of \mathbb{R}^2 .

(c). (3 points) For all $h \in \mathbb{R}$, prove that

$$A_h = [(0, h)] ,$$

in which $[(0, h)]$ denotes the equivalence class of $(0, h)$ with respect to the relation R .

Exercise 6 (new sheet of paper)

In this exercise, A and B are subsets of an uncountable set U .

(a). (4 points) Prove that $A \cup B$ is countable if A and B are countable and their intersection $A \cap B$ is empty.

(b). (3 points) Prove:

$$A \text{ is countable} \implies U - A \text{ is uncountable.}$$

(c). (3 points) Prove or disprove:

$$B \text{ is uncountable} \implies U - B \text{ is countable.}$$